



MATERNITE		Procédure n° : MAT 0071
<u>Responsable</u> : Dr P. Raynal <u>Fonction</u> : Praticien hospitalier	<u>Approbateur</u> : Dr P. PANEL <u>Fonction</u> : Chef de Service	<u>Version</u> : 1 <u>Mise à jour</u> : 2/5/2013 <u>Date de création</u> : 19/06/2008
<u>signature</u>	<u>signature</u>	<u>Liste de diffusion</u> : Maternité 1 Consultation d'Obstétrique Salle de Naissance
Prélèvements vaginaux à effectuer dans le cadre d'une menace d'accouchement prématuré		

- 2 écouvillons (bouchon blanc avec milieu de transport dans le fond de l'étui) : exocol et vagin pour chacun des écouvillons.

En cas de recherche associée de Streptocoque du groupe B, un nouveau tube n'est pas nécessaire, le prélèvement doit cependant être réalisé sur l'ensemble de la cavité vaginale incluant absolument le balayage des parois de la moitié inférieure du vagin jusqu'au vestibule et la vulve. Bien préciser sur la feuille de prescription la recherche de Streptocoque du groupe B.

- 2 écouvillons (bouchon blanc avec milieu de transport dans le fond de l'étui) : endocol pour chacun des écouvillons.
- 1 écouvillon sec (bouchon blanc sans milieu de transport qui sera déchargé immédiatement dans un milieu de transport spécifique pour mycoplasme) : exocol et vagin.
- 1 écouvillon spécifique pour recherche de Chlamydiae (qui sera déchargé immédiatement dans un milieu de transport spécifique) : endocol.

Bien identifier sur les tubes le site de prélèvement (endocol, exocol, vagin).

Apposer sur la feuille de prescription de microbiologie les renseignements cliniques (terme, facteurs de risque de MAP ...) et préciser la recherche de VAGINOSE.