



<b>MATERNITE</b>		Procédure n° : <b>MAT P0091</b>
<u>Responsable</u> : Dr DOMMERGUES Dr RAYNAL <u>Fonction</u> : Praticien Hospitalier <u>signature</u>	<u>Approbateur</u> : Dr P. PANEL <u>Fonction</u> : Chef de Service  <u>signature</u>	Version : 1 Mise à jour : 26/04/2013 Date de création : 31/10/12
		<u>Liste de diffusion</u> : Services de maternité (1 et 2)
<b>VACCINATION DES FEMMES SERONEGATIVES POUR LA RUBEOLE</b>		

- Femmes séronégatives pour la rubéole n'ayant pas reçu 2 doses de vaccin rubéole ou R.O.R:

### **Administrer le vaccin combiné Rougeole-Rubéole-Oreillons MMRVaxPro®**

par voie IM ou SC dans la région deltoïdienne

- L'allaitement n'est pas une contre-indication à cette vaccination.
- Contraception dans les deux mois suivant la vaccination.
- Les sérologies post-vaccinales ne sont pas utiles.

Le seul vaccin monovalent contre la rubéole (Rudivax®) n'est plus commercialisé.

Le Haut Conseil de Santé Publique recommande une vaccination combinée R.O.R, avant la sortie de maternité pour les femmes séronégatives pour la rubéole :

*« Pour les femmes dont la sérologie prénatale est négative ou inconnue, la vaccination ne pouvant être pratiquée pendant la grossesse, elle devra être pratiquée immédiatement après l'accouchement, de préférence avant la sortie de la maternité ».*

*« Les femmes nées avant 1980 non vaccinées contre la rubéole, pour qui la vaccination contre la rubéole est recommandée, doivent recevoir une dose de vaccin trivalent (rougeole, oreillons, rubéole) au lieu d'un vaccin rubéoleux seul ».*

Il n'y a pas lieu de revacciner des femmes ayant reçu deux vaccinations préalables, quel que soit le résultat de la sérologie si elle a été pratiquée.

### **Références**

RCP Priorix® et RCP MMRVaxPro®

Recommandations vaccinales 2012 selon l'avis du HCSP. BEH 14-15/10 avril 2012



**MATERNITE**

Procédure n° : **MAT P0001**

Version :

**TITRE DE LA PROCEDURE**